AVERTISSEMENTS AGRICOLES BEP 13-7-99 929126 D'AVERTISSEMENTS

DES STATIONS

AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS. C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL 15 Francs

Supplément n° 2 au Bulletin Technique N° 70

8 JUILLET 1966

- 23 -

AVERTISSE ENTS

VIGNES

MILDIOU DE LA VIGNE

Les conditions climatiques du mois de Juin ont été favorables à l'évolution du Mildiou. Dans tous les vignobles où les taches primaires étaient nombreuses et où la protection a été insuffisante durant le mois de Juin, des attaques parfois sévères sont actuellement observées sur feuilles et sur grappes sous forme de Rot-Gris.

En conséquence il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement tout au début de la semaine prochaine. Dans les vignes où le Mildiou de la Grappe a fait son apparition, il est souhaitable de compléter ce traitement par un poudrage cuprique ou organo-cuprique.

BLACK-ROT DE LA VIGNE

Le traitement dirigé contre le Mildiou de la vigne sera efficace contre le Black-Rot de la vigne dont les manifestations sur feuilles et même sur grappes sont parfois très nombreuses dans les vignobles contaminés et insuffisamment protégés.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES PONMES ET DES POIRES

La dernière période chaude a favorisé l'activité des derniers papillons de la première génération. Des pontes ont été déposées.

Le dernier traitement a perdu la plus grande partie de son efficacité. En conséquence il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement au début de la semaine prochaine.

TAVELURES DU POLMIER ET DU POIRIER

Les conditions climatiques ayant été favorables aux contaminations secondaires il est prudent d'ajouter un fongicide à la bouillie destinée à combattre le Carpocapse.

INFORMATIONS

VIGNES

OIDIUM DE LA VIGNE

Dans tous les vignobles sensibles, il est conseillé d'ajouter un produit actif contre l'Ofdium à la bouillie destir.c à combattre le Mildiou.

7.1138

VERS DE LA GRAPPE

Le second vol vient de débuter, mais il est encore trop tôt pour intervenir Il est nécessaire d'attendre un nouvel avis de la station.

ARBRES FRUITIERS

ANTHRACNOSE DU CERISIER

Les manifestations sont de plus en plus nombreuses dans les vergers où la protection a été insuffisante.

Not s rappelons les indications données dans notre bulletin du 22 Juin. Un traitement doit être effectué immédiatement après la récolte sur toutes les varietés sensibles à la maladie.

POMILES DE TERRE

MILDIOU DE LA PONME DE TERRE

Les pluies parfois très abondantes de ces derniers jours ont très souvent lessivé le traitement conseillé dans notre bulletin du 22 Juin.

En conséquence dans toutes les cultures encore en pleine végétation et dont l'état sanitaire est satisfaisant il y a lieu d'effectuer un nouveau traitement.

Nous rappelons que dans les cultures contaminées il est nécessaire de détruire le feuillage dès que possible afin d'éviter des attaques graves de tubercules. Dans les cultures hâtives où la tubérisation est terminée il y a lieu de détruire le feuillage immédiatement ou au plus tard à l'apparition des premières taches sur feuilles.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE LA TOMATE

Les conditions climatiques actuelles étant favorables à la maladie, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement contre cette maladie.

MILDIOU DE L'OIGNON

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à l'évolution de la maladie. Il est conseillé de poursuivre la protection de toutes les cultures en pleine végétation.

SEPTORIOSE DU CELERI

Il est également conseillé de continuer la protection des cultures de cele-

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

G. RIBAULT.

B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux, G. BENAS.

Imprimé à la Station d'Orléans.

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.